

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



สาเหตุ



1. ยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด
2. หญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสู่ทารกในครรภ์
3. เชื้อสามารถติดจากคนสู่คนโดยการมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มเสี่ยง



เด็กวัยเรียน
อายุ 5-14 ปี



วัยทำงาน
อายุ 25 -54 ปี



หญิงตั้งครรภ์



การป้องกัน




1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้าน เช่น การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่บรรจุน้ำ เพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

3. ระวังไม่ให้ยุงกัด โดยการสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือทายากันยุงนอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง

อาการ



ต่อมน้ำเหลืองโต



มีไข้



มีผื่นแดง



ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ



อุจจาระร่วง



เยื่อตาอักเสบ
ตาแดง



ปวดศีรษะ

